

A

Wirusowe zapalenie wątroby typu A jest chorobą wywoływaną przez jeden z typów wirusa (typ A) atakujących wątrobę¹.

WZW typu A W LICZBACH

1 MLN 400 TYS osób na świecie zapada co roku na **ostre WZW typu A**² (dane z 2016 r.)

7134 osób na świecie zmarło³ (2016 r.) **1067** osób w Polsce zachorowało⁴ (2019 r.)

DROGI ZAKAŻENIA³

Wirus przenosi się poprzez:



Zanieczyszczoną wodę i żywność



Brudne ręce



Kontakty seksualne



Kontakt z odpadami

OBJAWY³

Przebieg WZW A u dorosłych jest cięższy niż u dzieci. Mogą pojawić się m.in.:



Objawy grypopodobne



Odbijanie, nudności, zgaga itp.



Ciemny mocz



Zażółcenie skóry i białkówki oczu

SKUTKI

Zakażenie może prowadzić do groźnych powikłań, tj.:



90% chorych jest hospitalizowanych⁴



Zapalenie i ostra niewydolność wątroby² (występuje bardzo rzadko)



Uszkodzenie nerek²

B

Wirusowe zapalenie wątroby typu B jest chorobą wywoływaną przez jeden z typów wirusa (typ B) atakujących wątrobę⁷.

WZW typu B W LICZBACH

257 MLN osób na świecie żyje z wirusem zapalenia wątroby **typu B**⁸ (dane z 2015 r.)

887000 osób na świecie zmarło⁸ (2015 r.) **2854** osób w Polsce zachorowało⁴ (2019 r.)

DROGI ZAKAŻENIA⁸

Wirus przenosi się poprzez:



Zabiegi medyczne i stomatologiczne



Kontakty seksualne



Zabiegi kosmetyczne, (np. tatuaż, pedicure, fryzjer)



Poród (od zakażonej matki na dziecko)

OBJAWY⁸

Uwaga: większość chorych nie ma żadnych dolegliwości⁷.



Zażółcenie skóry i białkówki oczu



Ciemny mocz



Zaburzenia pokarmowe



Złe samopoczucie, brak apetytu

SKUTKI

Najczęstsze powikłania, to m.in.:



Marskość i rak wątroby⁹



Zapalenie nerek⁹



Zapalenia stawów⁹



Zaburzenia krzepnięcia krwi⁹

PROFILAKTYKA

Szczepienie przeciw WZW typu A

Najskuteczniejszą metodą profilaktyki jest szczepienie¹.

Jest zalecane w programie szczepień ochronnych²

Daje długotrwałą ochronę¹

Zalecane m.in.:

wyjżdżającym do krajów o wysokim ryzyku zakażenia (Bułgaria, Egipt, Tunezja⁶);

zatrudnionym przy produkcji i dystrybucji żywności³;

dzieciom w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz młodzieży, które nie chorowały na WZW typu A⁵.

PROFILAKTYKA

Szczepienie przeciw WZW typu B

Zaleca się m.in. osobom dorosłym, zwłaszcza w wieku starszym⁵.

(Polacy powyżej 35. roku życia nie zostali objęci powszechnymi szczepieniami przeciw WZW typu B)¹⁰

Odporność utrzymuje się co najmniej 20 lat⁸

Zmniejsza ryzyko raka wątroby⁸

Zapytaj lekarza o szczepienie przeciw WZW typu A i WZW typu B.

Referencje:

1. <https://www.mp.pl/pacjent/szczepienia/szczepienia-i-szczepionki/66812,szczepienie-przeciwkowzw-typu-a>, dostęp: 05.2021.
2. Jacek Juszczyk, Poznań, Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu A, Medycyna Praktyczna, aktualizacja: [https://www.mp.pl/szczepienia/choroby/choroby_wzwa/91239,ostre-wirusowe-zapalenie\[1\]watroby-typu-a](https://www.mp.pl/szczepienia/choroby/choroby_wzwa/91239,ostre-wirusowe-zapalenie[1]watroby-typu-a), dostęp: 05.2021.
3. <https://www.who.int/newsroom/fact-sheets/detail/hepatitis-a>, dostęp: 05.2021.
4. NIZP-PZH, http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/2019/Ch_2019.pdf, dostęp: 05.2021.
5. PSQ, http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2020/117/akt.pdf, dostęp: 05.2021.
6. <http://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/wzw-a/3/>, dostęp: 05.2021.
7. [https://www.mp.pl/szczepienia/choroby/choroby_wzwb/91243,przewleklo\[1\]wirusowe-zapalenie-watroby-typu-b](https://www.mp.pl/szczepienia/choroby/choroby_wzwb/91243,przewleklo[1]wirusowe-zapalenie-watroby-typu-b), dostęp: 05.2021.
8. <http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-b>, dostęp: 05.2021.
9. [http://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/wzw-b/2/#jaki\[1\]sa-objawy-wzw-b](http://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/wzw-b/2/#jaki[1]sa-objawy-wzw-b), dostęp: 05.2021.
10. [https://www.mp.pl/szczepienia/praktyka/przypadki/143413,kwalifikacja-do\[1\]szczepienia-przeciwko-wzw-typu-b](https://www.mp.pl/szczepienia/praktyka/przypadki/143413,kwalifikacja-do[1]szczepienia-przeciwko-wzw-typu-b), dostęp: 05.2021.

GSK Commercial Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, tel.: 22 576 9000, fax: 22576 9001, pl.gsk.com. Szczepienie, podobnie jak podanie leku, może wiązać się z wystąpieniem działań niepożądanych.

Wszystkie działania niepożądane produktów leczniczych należy zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 492-13-01, fax (22) 492-13-09, zgodnie z zasadami monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych.

Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dostępny jest na stronie Urzędu www.urpl.gov.pl lub Podmiotu Odpowiedzialnego za produkt, którego zgłoszenie dotyczy. Treści zamieszczone w materiale mają wyłącznie charakter informacyjny, nie mogą być traktowane jako forma konsultacji medycznej i nie mogą zastąpić konsultacji lekarza, do którego należy ostateczna decyzja o sposobie i zakresie stosowanego leczenia.